

# LOS GRANDES TAMBIÉN SE VACUNAN

TA TU NA'NA NO KE'NA VACUNA KÉRATICHATUKXI TZINAKUARHSINTI



**ENFERMEDAD QUE PREVIENE Y SINTOMAS**

**CUÁNDO SE PONE**

**DÓNDE SE PONE**

**VACUNA**

- MENINGITIS**: Calentura, dolor de cabeza fuerte, cuello tieso, dolor de ojos con luces brillantes, sueño, confusión, ascos y vómito muy fuerte. 1 dosis en jóvenes que comparten dormitorio.
- HEPATITIS B**: Ascas y no hay ganas de comer. Ojos y piel amarillos. Orina naranja o café (como Coca-Cola). Calentura y mucha debilidad. 3 dosis con espacio de 1-2, 4-6 meses.
- INFLUENZA (Gripes)**: Calentura, dolor de cabeza, cansancio, tos, dolor de garganta, catarro, dolor en todo el cuerpo. A veces hay diarrea y vómito. 1 dosis por año.
- COVID-19 (Coronavirus)**: Muchas ocasiones no tienes síntomas. Dificultad para respirar, tos, fiebre, pérdida del olfato y gusto. Según la marca: 2 dosis con espacio de 21-28 días o 1 dosis con espacio de 4 a 8 semanas en menores de 49 años.
- VARICELA (Varicella)**: Ampollitas con agua que empiezan en cara, siguen en pecho y terminan en brazos y piernas. Al secarse, queda una costra y da mucha comezón. 1 dosis.
- SARAMPIÓN (Measles)**: Catarro, calentura, tos y diarrea. Salen puntitos rojos en la boca con dolor y salpullido rojo en todo el cuerpo. 2 dosis con espacio de 4 a 8 semanas en menores de 49 años. Y para personas entre 11 y 49 años.
- PAPERAS (Mumps)**: Calentura, dolor al abrir la boca o al comer. Hinchazón debajo de las orejas, primero un lado y luego el otro. 1 o 2 dosis en caso de no haber sido vacunado cuando niño (1, 4 y 6 años).
- RUBÉOLA (Rubella)**: Se hincha y duele nuca y cuello. Puntitos blancos en boca y después manchas rojas en todo el cuerpo que duran como 5 días. 1 o 2 dosis en caso de no haber sido vacunado cuando niño (1, 4 y 6 años).
- DIFTERIA (Diphtheria)**: Catarro, calentura, dolor de cabeza y garganta. Puntos grises en garganta, mal aliento e hinchazón de cuello. 1 dosis cada 10 años después de los 19 años.
- TÉTANOS (Tetanus)**: Molestia al tragar, quijada, cuello y otras partes del cuerpo se ponen tiesos. No se puede caminar bien. Dolor fuerte en quijada y todo el cuerpo. 3 dosis en espacio de 1-6 meses mínimo si no se puso a los 11-12 años y se aplica hasta los 18.
- TOS FERINA (Pertussis)**: Catarro, calentura, mocos, vómitos, tos frecuente y seca. 3 dosis en espacio de 1-6 meses mínimo si no se puso a los 11-12 años y se aplica hasta los 18.

**VACUNA** (Central): HB, COVID-19, INFLUENZA, MENINGOCÓCICA, Tdap, Td, MMR, VAR, NALGA, BRAZO izquierdo, BRAZO derecho, PIERNA O BRAZO derecho.

